

# ວິທີອຸມລູກຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ສັກຢາວັກຊີນ

ອຸມເດັກນ້ອຍສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນ ແລະ ປ້ອງກັນການເພັງ ຕັ້ງໃນຂະນະທີ່ລູກຂອງທ່ານກຳລັງຮັບການສັກຢາວັກຊີນ. ພ້ອມທັງ ເປັນ ການບຽງເບນຄວາມສົນໃຈ, ຈິງເລົາເລື່ອງຕ່າງໆ, ຮອງເພີງ ຫຼື ຫາຍໃຈ ເລັກໆ, ການອຸມເດັກນ້ອຍແບບສະບາຍໆ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການສັກຢາວັກຊີນ ໆາຍຂຶ້ນ.

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳສຳລັບວິທີການອຸມລູກຂອງທ່ານ. ຜູ້ສະໜອງການ ດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານຈະມີຄຳແນະນຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການອຸມລູກໃນ ລະຫວ່າງທີ່ກຳລັງໃຫ້ການສັກຢາວັກຊີນ.


## ອຸມແນ້ອຍ

- ອຸມລູກຂອງທ່ານໄວ້ເທິງຕັກຂອງທ່ານ.
- ເອົາແຂນຂອງລູກທ່ານແນບໃສ່ເທິງໜ້າເອິກ ຫຼື ກ້ອງຂີ້ແຮ້ໜີບໄວ້ຄອຍໆຄ້າຍຄືກັບການກອດ.
- ຈັບແຂນ ແລະ ຂາລູກໃຫ້ແໜ້ນ.
- ຈົ່ງຫົວເຂົ້າລູກຂອງທ່ານໜ້ອຍໜຶ່ງ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍກ້າມຂຶ້ນຕົ້ນຂາ.



## ອຸມເດັກນ້ອຍທີ່ກຳລັງຮຽນຍ່າງຈາກດ້ານຂ້າງ

- ອຸມລູກຂອງທ່ານໄວ້ເທິງຕັກຂອງທ່ານ.
- ເອົາແຂນຂອງລູກທ່ານແນບໃສ່ເທິງໜ້າເອິກ ຫຼື ກ້ອງຂີ້ແຮ້ ແລະ ຫຼັງຂອງທ່ານ. ໃຫ້ໜີບລູກຂອງທ່ານໃສ່ລະຫວ່າງຂາຂອງທ່ານໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ເອື້ອຍໃສ່ກັບຕັ້ງ.
- ເອົາແຂນຂອງທ່ານກອດຫຼັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຈັບໂຕ ແລະ ແຂນຂອງເດັກນ້ອຍແນບໃສ່ໂຕທ່ານ.
- ໃຊ້ແຂນອີກເບື້ອງໜຶ່ງຈັບປາຍແຂນຂອງເດັກນ້ອຍແນບກັບທ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
- ໃຊ້ຂາຂອງທ່ານທັງສອງເບື້ອງໜີບຂາເດັກນ້ອຍໄວ້.



## ກອດດ້ານໜ້າເດັກນ້ອຍ (ຂາຮັດໄວ້ ຫຼື ກອດ)

- ໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັ່ງເທິງຕັກຂອງທ່ານ ປິ່ນໜ້າໃສ່ທ່ານ ແລະ ຈັບຂາຂອງເດັກນ້ອຍອ້ອມໃສ່ແອວຂອງທ່ານ.
- ເອົາແຂນຂອງທ່ານກອດແອວຂອງເດັກນ້ອຍ.
- ຈັບແຂນຂອງເດັກນ້ອຍຮັດໃສ່ແອວຂອງທ່ານ ແລະ ໃຊ້ແຂນຂອງທ່ານຮັດພວກເຂົາໃຫ້ແໜ້ນ.
- ພາດຫົວຂອງເດັກນ້ອຍໃສ່ປ່າຂອງທ່ານ ແລະ ປິ່ນຫົວອອກໄປດ້ານນອກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຫັນການສັກຢາ.
- ຖ້າຫາກແຂນຂອງເດັກນ້ອຍພາດຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງທ່ານ, ກິດແຂນຂອງພວກເຂົາເບົາໆໃສ່ບອນອີງຂອງຕັ້ງ.



## ອຸ້ມແບບເອົາຫຼັງຕິດກັບໜ້າເອິກຂອງທ່ານ (ດ້ານໜ້າ)

- ອຸ້ມລູກຂອງທ່ານໄວ້ເທິງຕັກຂອງທ່ານຫັນໜ້າອອກໄປທາງກົງກັນຂ້າມກັບທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານນັ່ງ.
- ໂອບກອດລູກຂອງທ່ານໄວ້ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງດຳເນີນການ, ເອົາແຂນຂອງທ່ານໄຂ່ວກັນໄວ້ທາງໜ້າຂອງເດັກຈັບແຂນເບື້ອງຂວາຂອງເດັກດ້ວຍມືຊ້າຍຂອງທ່ານ ແລະ ແຂນເບື້ອງຊ້າຍຂອງເດັກດ້ວຍມືເບື້ອງຂວາຂອງທ່ານ.
- ໃຊ້ກົກຂາຂອງທ່ານໜົບຂາທັງສອງຂ້າງຂອງເດັກ ແລະ ເອົາຂາຂອງທ່ານໄຂ່ວກັນເຕັງເດັກໄວ້.
- ລະວັງຫົວລູກຂອງທ່ານບໍ່ໃຫ້ຕໍາໜ້າທ່ານໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເໜັງຕິງ.



## ອຸ້ມລູກຂອງທ່ານປິ່ນເອິກໃສ່ກັນ (ຮັດ ຫຼື ກອດ)

- ເອົາລູກຂອງທ່ານນັ່ງຕັກຫັນໜ້າເຂົ້າຫາທ່ານ ແລະ ໃຫ້ຂາເດັກນ້ອຍກອດແອວທ່ານໄວ້.
- ເອົາແຂນຂອງທ່ານກອດແອວຂອງເດັກນ້ອຍ.
- ເອົາແຂນຂອງເດັກນ້ອຍກອດແອວຂອງທ່ານ ແລະ ກອດເຂົາໃຫ້ແໜ້ນດ້ວຍແຂນຂອງທ່ານ.
- ລູກຂອງທ່ານສາມາດເອົາຫົວຂອງເຂົາໃສ່ເທິງປ່າຂອງທ່ານ ແລະ ປິ່ນຫົວ ໄປເບື້ອງກົງກັນຂ້າມກັບການສັກຢາ.
- ຖ້າແຂນຂອງເດັກພາດລົງໃສ່ຫຼັງຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຍູ້ແຂນຂອງເດັກໃສ່ບ່ອນເອື້ອຍຂອງຕັ້ງຢ່າງເບົາໆ.



## ອຸ້ມຈາກດ້ານຂ້າງແບບເບົາໆ

- ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານນັ່ງຕັກຫັນທາງຂ້າງເຂົ້າຫາທ່ານ.
- ຮັດແຂນຂອງລູກທ່ານອ້ອມເຂົ້າມາໃສ່ຫຼັງຂອງທ່ານ ແລະ ກິດເຂົ້າຫາບ່ອນ ເອື້ອຍຂອງຕັ້ງຢ່າງເບົາໆ.
- ໃຊ້ແຂນຂອງທ່ານກອດຫຼັງຂອງລູກທ່ານໄວ້ ແລະ ຈັບກົກແຂນຂອງເຂົາ.
- ໃຊ້ມືອີກເບື້ອງໜຶ່ງຈັບແຂນ ແລະ ຂາຂອງເດັກນ້ອຍ.



## ອຸ້ມແບບຂ້າງຕໍ່ຂ້າງ

- ນັ່ງຂ້າງໆລູກຂອງທ່ານ ແລະ ໃຊ້ແຂນຂອງທ່ານກອດປ່າຂອງເດັກ.
- ກອດລູກໃຫ້ແໜ້ນຕິດກັບໂຕທ່ານ.
- ໃຊ້ແຂນຂອງເດັກນ້ອຍກອດຫຼັງຂອງທ່ານໄວ້ ແລະ ກິດໂຕເຂົາເຂົ້າຫາບ່ອນເອື້ອຍຂອງຕັ້ງຢ່າງເບົາໆ.
- ຈັບແຂນຂອງເດັກນ້ອຍມາພາດໃສ່ໂຕຂອງທ່ານ.

