

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລະ ການຖືພາ



ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ກັບຄົນທີ່ຖືພາໄດ້

- ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄົນທີ່ຖືພາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການຕິດເຊື້ອ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮຸນແຮງ ຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ຖືພາ.
- ມີຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຂອງການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນໄລຍະຖືພາ ແລະ ວັກຊີນທີ່ໄດ້ຜົນດີກັບຄົນທີ່ຖືພາ.
- ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງຈາກການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຖືພາ. ນີ້ຍັງລວມ ເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ. ຂໍ້ມູນຍັງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມີຫຼາຍກວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການສັກຢາວັກຊີນໃນໄລຍະທີ່ຖືພາ.
- ຖ້າທ່ານຖືພາ, ຮັບການສັກຢາວັກຊີນເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນທ່ານຈາກການເຈັບປ່ວຍຈາກໂຄວິດ-19 ທີ່ຮຸນແຮງ.
- ຈົ່ງປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ.



ຄົນທີ່ກຳລັງຕ້ອງການຈະມີລູກສາມາດສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19.

- ຖ້າທ່ານກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຖືພາ ຫຼື ມີແຜນທີ່ຈະຖືພາໃນອານາ ຄົດ, ແນະນຳໃຫ້ເຂົ້າຮັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19.
- ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ລະບຸວ່າ ບັນຫາການຈະເລີນພັນມີຜົນກະທົບ ຂ້າງຄຽງຈາກການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19.



mn.gov/vaccine