



لقاح كوفيد-١٩ | للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقات

معلومات لمقدمي الرعاية



يوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها كل شخص عمره ٥ سنة وأكثر بالحصول على تلقيح كوفيد-١٩. ولأن الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقات قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بحالة أشد من مرض كوفيد-١٩، فإن الأسر ومقدمي الرعاية مطالبون بالتفكير بقوة في تطعيم الأولاد الذين يعانون من أي حالة صحية أو عجز.

• تم التصريح باستخدام لقاح فايزر لكوفيد-١٩ للأولاد الذين يبلغون من العمر ٥ عامًا وما فوق. وقد ثبت أنه آمن وواقي ضد مرض كوفيد-١٩ للأولاد في هذه الفئة العمرية. وقد يتم التصريح بمنتجات لقاحات أخرى في المستقبل القريب، حيث يتم دراستها في الفئات العمرية الأصغر سنًا.

• الشباب الذين يعانون من حالات طبية يمكنهم الحصول على لقاح ضد مرض كوفيد-١٩. والسبب الوحيد الذي يمنع أي شخص من تلقي اللقاح هو أن يكون قد تعرض لرد فعل يهدد حياته (وهو رد فعل تتطلب استخدام قلم EPI) بسبب أي من المكونات في لقاح كوفيد-١٩.

لا يحتوي لقاح فايزر لأي فئة عمرية على

- البيض
- مواد حافظة
- اللاتكس



ماذا يحتوي اللقاح؟

يحتوي لقاح فايزر للأشخاص من سن ١٢ عامًا وما فوق على:

- حمض النووي الريبي المرسال mRNA
- دهون: (٤- هيدروكسي بيوتيل)ازاندييل)بيس(هيكزان-٦,١ ديبيل)بيس(٢- هيكز يلديكانوات)، ٢ [(بولي إيثيلين جليكول)-٢٠٠٠]- ن، ن-ديتيراديسيل أسيتاميد، ١، ٢-ديستراويل-سن-غليسرو-٣ --فوسفوكولين، والكوليسترول)
- الأملاح: كلوريد البوتاسيوم، وفوسفات البوتاسيوم أحادي القاعدة، وكلوريد الصوديوم، وديهيدرات فوسفات الصوديوم ثنائي القاعدة
- السكر

يحتوي لقاح فايزر للأولاد من سن ٥-١١ عامًا وما فوق على:

- حمض النووي الريبي المرسال mRNA
- دهون: (٤- هيدروكسي بيوتيل)ازاندييل)بيس(هيكزان-٦,١ ديبيل)بيس(٢- هيكز يلديكانوات)، ٢ [(بولي إيثيلين جليكول)-٢٠٠٠]- ن، ن-ديتيراديسيل أسيتاميد، ١، ٢-ديستراويل-سن-غليسرو-٣ --فوسفوكولين، والكوليسترول)
- الأملاح: كلوريد الصوديوم
- المتعادلات: ثلاثي ميثامين، هيدروكلوريد ثلاثي ميثامين
- السكر



المخاوف المحتملة

- تاريخ الحساسية: عادة لا يعاني الأطفال الذين يعانون من حساسية أكثر حدة تجاه أشياء غير مدرجة أعلاه من مشكلة مع لقاح كوفيد-19. سيطلب منهم الانتظار لمدة ٣٠ دقيقة تقريبًا بعد حقنة اللقاح لمراقبة الأعراض.
- التهاب عضلة القلب والشغاف (التهاب القلب): استلمت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) تقارير عن التهاب عضلة القلب والشغاف عند مراهقين شبان صغار بعد تلقي لقاح فايزر وموديرنا. وهو أكثر شيوعًا بين الذكور. لا يبدو أن هذه الحالة النادرة مرتبطة بأي ظروف صحية أساسية. معظم الحالات كانت خفيفة ويمكن علاجها. تفوق الفوائد المعروفة للتلقيح ضد مرض كوفيد-19 المخاطر بشكل كبير. تعرف على المزيد على رابط مركز السيطرة على الأمراض: [التهاب عضلة القلب والشغاف بعد تلقيح كوفيد-19 ذات حمض نووي ريبوي المرسل \[www.cdc.gov/coronavirus-2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html\]\(https://www.cdc.gov/coronavirus-2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html\)](https://www.cdc.gov/coronavirus-2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html)



طلب الترتيبات

عند تحديد موعد أو الوصول إلى موقع التلقيح، تأكد من إعلام الموظفين بأن الطفل الذي يعتنون به قد يحتاج إلى مساعدة إضافية. على سبيل المثال، ربما لا يمكنه ارتداء قناع أو الجلوس والانتظار بعد حقنة التلقيح. ربما الأضواء الساطعة والغرف الصاخبة تزعجه. يمكنك طلب ترتيبات مثل:

- السير بعد الحقنة بدلا من الجلوس.
- الطلب من شخص أن يلحق صغار العمر في سيارتك.
- أن يرافقهم رفيقهم المفضل ويساعدهم أثناء الموعد.
- الحصول على اللقاح في غرفة هادئة بعيداً عن الحشود.

هل لديك أسئلة؟

سيكون مقدمو الرعاية الصحية متاحين للإجابة على أسئلتك في موعد التلقيح ضد مرض كوفيد-19. ومع ذلك، إذا كانت لديك أي أسئلة قبل ذلك، فاسأل موفر الرعاية الصحية الموثوق به.

m1 MINNESOTA


mn.gov/vaccine

Minnesota Department of Health | health.mn.gov | 651-201-5000 | 625 Robert Street North PO Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975
الإلكتروني health.communications@state.mn.us لطلب تنسيق بديل. (Arabic)

11/16/2021

الآثار الجانبية الشائعة

على غرار التلقيحات الروتينية الأخرى، يتعرض بعض الأشخاص لتأثيرات جانبية بعد الحصول على لقاح كوفيد-19. عادةً ما تستمر الآثار الجانبية يومًا أو يومين، وعادةً لا تمنع الشخص من ممارسة الأنشطة اليومية. بعد الحصول على لقاح كوفيد-19، قد يعاني شخص ما من:



قد يعاني الشباب من هذه الآثار الجانبية بعد التلقيح التي تسبب لهم عدم الإرتياح، غير أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لجعلهم يحسّون بتحسن، مثل إعطائهم مسكنات ألم لا تحتوي على الأسبيرين (تيلنول أو إيبوبروفن) أو تشعّره بالراحة من خلال أنشطة هادئة. إذا شعرت بآثار جانبية خطيرة، فانتقل إلى المستشفى أو اتصل بالرقم ٩١١.